

# スピリーバ・スピオルト【レスピマツト】

## 《各部位の名称・残薬の確認方法》



キャップ

吸入口

ボタン

透明ケース

カウンター



透明ケースを回転させる度にカウンターが進んで行きます。目盛りで正確な残薬数は分かりませんが、透明ケースが回転しなくなるまでは使用する事が出来ます。

### 《開封時及び3日以上使用しなかった場合の準備操作》

初回はカートリッジ挿入後、吸入せずに4回噴霧してください。  
1週間以上使用しなかった場合も同様に、吸入せずに4回噴霧してください。

### 《吸入手順》

①	薬の準備	透明ケースを180度回転させます。 ボタンを押さないよう横からキャップを空けます。
②	息吐き	吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。
③	吸入	吸入口を歯でくわえます。 ボタンを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。
④	息止め	吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。
※1回2吸入なのでもう一度①からの操作を繰り返して下さい		
⑤	後片付け	キャップを閉めます。
⑥	うがい	吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。

# アドエア【エアゾール】

## 《各部位の名称》



### 《開封時及び3日以上使用しなかった場合の準備操作》


吸入器を数回振ったあと、吸入せずに4回噴霧してください。

### 《吸入手順》

①	薬の準備	吸入口からキャップを外します。 吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。
②	息吐き	吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。
③	吸入	吸入口を歯でくわえます。 ポンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。
④	息止め	吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。
※1度に複数回吸入時は①に戻る		
⑤	後片付け	キャップを閉めます。
⑥	うがい	吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。

# オルベスコ【インヘラー】

## 《各部位の名称・残薬の確認方法》



ポンベ

キャップ

吸入口

吸入補助器具を使用する事で  
少ない力でも操作が出来ます。

### 《開封時及び3日以上使用しなかった場合の準備操作》


吸入器を数回振ったあと、吸入せずに3回噴霧してください。

### 《吸入手順》

①	薬の準備	吸入口からキャップを外します。 吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。
②	息吐き	吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。
③	吸入	吸入口を歯でくわえます。 ポンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。
④	息止め	吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。
※1度に複数回吸入時は①に戻る		
⑤	後片付け	キャップを閉めます。
⑥	うがい	吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。

# キューバール【エアゾール】

## 《各部位の名称》



ポンベ

キャップ

吸入口

### 《開封時及び3日以上使用しなかった場合の準備操作》


吸入器を数回振ったあと、吸入せずに2回噴霧してください。

### 《吸入手順》

①	薬の準備	吸入口からキャップを外します。 吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。
②	息吐き	吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。
③	吸入	吸入口を歯でくわえます。 ポンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。
④	息止め	吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。
※1度に複数回吸入時は①に戻る		
⑤	後片付け	キャップを閉めます。
⑥	うがい	吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。

# サルタノール【インヘラー】

## 《各部位の名称》



### 《開封時及び3日以上使用しなかった場合の準備操作》


吸入器を数回振ったあと、吸入せずに2回噴霧してください。

### 《吸入手順》

①	薬の準備	吸入口からキャップを外します。 吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。
②	息吐き	吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。
③	吸入	吸入口を歯でくわえます。 ポンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。
④	息止め	吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。
※1度に複数回吸入時は①に戻る		
⑤	後片付け	キャップを閉めます。
⑥	うがい	吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。

# テルシガン【エロゾル】

## 《各部位の名称》



### 《開封時及び3日以上使用しなかった場合の準備操作》


吸入器を数回振ったあと、吸入せずに2回噴霧してください。

### 《吸入手順》

- |                 |      |   |
|-----------------|------|---|
| ①               | 薬の準備 | 吸入口からキャップを外します。<br>吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。 |
| ②               | 息吐き  | 吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。                    |
| ③               | 吸入   | 吸入口を歯でくわえます。<br>ポンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。 |
| ④               | 息止め  | 吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。                   |
| ※1度に複数回吸入時は①に戻る |      |   |
| ⑤               | 後片付け | キャップを閉めます。                              |
| ⑥               | うがい  | 吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。                 |

# フルタイド【エアゾール】

## 《各部位の名称》



### 《開封時及び3日以上使用しなかった場合の準備操作》


吸入器を数回振ったあと、吸入せずに4回噴霧してください。

### 《吸入手順》

①	薬の準備	吸入口からキャップを外します。 吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。
②	息吐き	吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。
③	吸入	吸入口を歯でくわえます。 ポンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。
④	息止め	吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。
※1度に複数回吸入時は①に戻る		
⑤	後片付け	キャップを閉めます。
⑥	うがい	吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。

# フルティフォームエアゾール

## 《各部位の名称・残薬の確認方法》



- ボンベ
- カウンター
- キャップ
- 吸入口

吸入補助器具(フルプッシュ)を使用する事で少ない力でも操作が出来ます

### フルプッシュ装着時



カウンターの色が緑⇒黄で残り40噴霧、黄⇒赤で残り20噴霧程になります。

### 《開封時及び3日以上使用しなかった場合の準備操作》

吸入器を数回振ったあと、吸入せずに4回噴霧してください。

### 《吸入手順》

① 薬の準備 吸入口からキャップを外します。  
吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。

② 息吐き 吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。

③ 吸入 吸入口を歯でくわえます。  
ポンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。

④ 息止め 吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。


※1度に複数回吸入時は①に戻る

⑤ 後片付け キャップを閉めます。

⑥ うがい 吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。

# ベロテック【エロゾル】

## 《各部位の名称》



### 《開封時及び3日以上使用しなかった場合の準備操作》


吸入器を数回振ったあと、吸入せずに2回噴霧してください。

### 《吸入手順》

①	薬の準備	吸入口からキャップを外します。 吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。
②	息吐き	吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。
③	吸入	吸入口を歯でくわえます。 ポンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。
④	息止め	吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。
※1度に複数回吸入時は①に戻る		
⑤	後片付け	キャップを閉めます。
⑥	うがい	吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。

# メプチン【エアー】・メプチンキッド【エアー】

## 《各部位の名称》



### 《開封時及び3日以上使用しなかった場合の準備操作》

吸入器を数回振ったあと、吸入せずに2回噴霧してください。

### 《吸入手順》

①	薬の準備	吸入口からキャップを外します。 吸入器を数回振り中の薬剤を均一にします。
②	息吐き	吸入器をくわえずに息を吐き一旦止めます。
③	吸入	吸入口を歯でくわえます。 ポンベを押すと同時にゆっくり深く吸い込みます。
④	息止め	吸入口から口を離し、3秒程度息を止めます。
※1度に複数回吸入時は①に戻る		
⑤	後片付け	キャップを閉めます。
⑥	うがい	吸入後はガラガラとブクブクを各3回ずつします。