

レジメン名	薬剤名	投与量/投与方法		投与日	投与間隔(日)	備考
乳がん:FEC100	エビルピシン	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	21日	day1-3 アプレビタント、 day2- テキサメタゾン等
	シクロホスファミド	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1		
	フルオロウラシル	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1		
乳がん:DTX	ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	21日	
乳がん:Weekly PTX	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1・8・15・22	28日	
乳がん:Trastuzumab	トラスツスマブ	初回8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	点滴静注	day1	21日	
乳がん:Trastuzumab + DTX	ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	21日	
	トラスツスマブ	初回8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	点滴静注	day1		
乳がん:Trastuzumab + Weekly PTX	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1・8・15	21日	
	トラスツスマブ	初回8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	点滴静注	day1		
乳がん:TC	ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	21日	day1-3 アプレビタント、 day2- テキサメタゾン等
	シクロホスファミド	600mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1		
乳がん:Trastuzumab + TC	ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	21日	day1-3 アプレビタント、 day2- テキサメタゾン等
	シクロホスファミド	600mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1		
	トラスツスマブ	初回8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	点滴静注	day1		
乳がん:EC	エビルピシン	90mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	21日	day1-3 アプレビタント、 day2- テキサメタゾン等
	シクロホスファミド	600mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1		
乳がん:Trastuzumab + Pertuzumab + DTX	ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	21日	
	トラスツスマブ	初回8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	点滴静注	day1		
	ペルツスマブ	初回840mg/body 目以降 240mg/day	点滴静注	day1		
乳がん:Trastuzumab + Pertuzumab	トラスツスマブ	初回8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	点滴静注	day1	21日	
	ペルツスマブ	初回840mg/body 目以降 240mg/day	点滴静注	day1		

乳がん:Trastuzumab emtansine	トラスツスマブ エムタンシン	3.6mg/kg	点滴静注	day1	21日	
---------------------------	-------------------	----------	------	------	-----	--