

| レジメン名 | 薬剤名 | 投与量/投与方法 | 投与日 | 投与間隔(日) | 備考 |
|-----------------------------|--------------|----------------------------------|----------------|------------------|-----|
| 大腸がん:mFOLFOX6 | オキサリプラチン | 85mg/m ² | 点滴静注 (同時投与) | day1 | |
| | レボネリナートカルシウム | 200mg/m ² | | | |
| | フルオロウラシル | 400mg/m ² | 急速静注 | | |
| | フルオロウラシル | 2400mg/m ² | 持続静注 | day1-2 (46時間) | |
| 大腸がん:mFOLFOX6 + BV | ペハシズマブ | 5mg/kg | 点滴静注 | day1 | |
| | オキサリプラチン | 85mg/m ² | 点滴静注 (同時投与) | | |
| | レボネリナートカルシウム | 200mg/m ² | | | |
| | フルオロウラシル | 400mg/m ² | 急速静注 | | |
| | フルオロウラシル | 2400mg/m ² | 持続静注 | day1-2 (46時間) | |
| 大腸がん:mFOLFOX6 + Panitumumab | パニツムマブ | 6mg/kg | 点滴静注 | day1 | |
| | オキサリプラチン | 85mg/m ² | 点滴静注 (同時投与) | | |
| | レボネリナートカルシウム | 200mg/m ² | | | |
| | フルオロウラシル | 400mg/m ² | 急速静注 | | |
| | フルオロウラシル | 2400mg/m ² | 持続静注 | day1-2 (46時間) | |
| 大腸がん:SOX | オキサリプラチン | 130mg/m ² | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| | S-1 | 1日2回 40-60mg/回 | 経口 | d1夕-d15朝 | |
| 大腸がん:SOX + BV | ペハシズマブ | 7.5mg/kg | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| | オキサリプラチン | 130mg/m ² | 点滴静注 | day1 | |
| | S-1 | 1日2回 40-60mg/回 | 経口 | day1夕-15朝 | |
| 大腸がん:CAPOX | オキサリプラチン | 130mg/m ² | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| | カペシチン | 1日2回 1000mg/m ² /回 | 経口 | day1夕-15朝 | |
| 大腸がん:CAPOX + BV | ペハシズマブ | 7.5mg/kg | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| | オキサリプラチン | 130mg/m ² | 点滴静注 | day1 | |
| | カペシチン | 1日2回 1000mg/m ² /回 | 経口 | day1夕-15朝 | |
| 大腸がん:FOLFIRI | イリリガン | 150mg/m ² | 点滴静注 (同時投与) | day1 | 14日 |
| | レボネリナートカルシウム | 200mg/m ² | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|------------------|-----|--|
| 大腸がん:FOLFIRI | フルオロウラシル | 400mg/m ² | 急速静注 | | 14日 | |
| | フルオロウラシル | 2400mg/m ² | 持続静注 | day1-2 (46時間) | | |
| 大腸がん:FOLFIRI + BV | ベハンスマブ | 5mg/kg | 点滴静注 | day1 | 14日 | |
| | イリノテカン | 150mg/m ² | 点滴静注 (同時投与) | | | |
| | レボネリナートカルシウム | 200mg/m ² | | | | |
| | フルオロウラシル | 400mg/m ² | 急速静注 | | | |
| | フルオロウラシル | 2400mg/m ² | 持続静注 | day1-2 (46時間) | | |
| 大腸がん:FOLFIRI + Panitumumab | パニツムマブ | 6mg/kg | 点滴静注 | day1 | 14日 | |
| | イリノテカン | 150mg/m ² | 点滴静注 (同時投与) | | | |
| | レボネリナートカルシウム | 200mg/m ² | | | | |
| | フルオロウラシル | 400mg/m ² | 急速静注 | | | |
| | フルオロウラシル | 2400mg/m ² | 持続静注 | day1-2 (46時間) | | |
| 大腸がん:FOLFIRI + Ramucirumab | ラムシルマブ | 8mg/kg | 点滴静注 | day1 | 14日 | |
| | イリノテカン | 150mg/m ² | 点滴静注 (同時投与) | | | |
| | レボネリナートカルシウム | 200mg/m ² | | | | |
| | フルオロウラシル | 400mg/m ² | 急速静注 | | | |
| | フルオロウラシル | 2400mg/m ² | 持続静注 | day1-2 (46時間) | | |
| 大腸がん:CPT-11 | イリノテカン | 150mg/m ² | 点滴静注 | day1 | 14日 | |
| 大腸がん:CPT-11 + Panitumumab | イリノテカン | 150mg/m ² | 点滴静注 | day1 | 14日 | |
| | パニツムマブ | 6mg/kg | 点滴静注 | | | |
| 大腸がん:CAPIRI + BV | ベハンスマブ | 7.5mg/kg | 点滴静注 | day1 | 21日 | UGT1A1遺伝子ホモ接合体 もしくは複合ヘテロ接合体の場合は イリノテカン150mg/m ² |
| | イリノテカン | 200mg/m ² | 点滴静注 | day1 | | |
| | カベシタビン | 1日2回 800mg/m ² /回 | 経口 | d1夕-d15朝 | | |
| 大腸がん:CAPIRI | イリノテカン | 200mg/m ² | 点滴静注 | day1 | 21日 | UGT1A1遺伝子ホモ接合体 もしくは複合ヘテロ接合体の場合は イリノテカン150mg/m ² |
| | カベシタビン | 1日2回 800mg/m ² /回 | 経口 | d1夕-d15朝 | | |
| 大腸がん:IRIS + BV | イリノテカン | 150mg/m ² | 点滴静注 | day1 | 21日 | |
| | S-1 | 1日2回 40-60mg/回 | 経口 | d1夕-d15朝 | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|------|-------------------|-----|--|
| | ペハンスマブ | 7.5mg/kg | 点滴静注 | day1 | | |
| 大腸がん:Panitumumab | パニツムマブ | 6mg/kg | 点滴静注 | day1 | 14日 | |
| 大腸がん:Trifluridine/Tipiracil + BV | トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合 | 1日2回 35 mg/m ² /回 | 経口 | day1-5 day8-12 | 28日 | |
| | ペハンスマブ | 5mg/kg | 点滴静注 | day1・15 | | |
| Pembrolizumab (MSI-High固形がん) | ペムブロリスマブ | 200mg/body | 点滴静注 | day1 | 21日 | |