

レジメン名	薬剤名	投与量/投与方法		投与日	投与間隔(日)	備考
胃がん:CPT-11	イリリテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1	14日	
胃がん:Weekly PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	day1・8・15	28日	
胃がん:DTX	ドセタキセル	60mg/m ²	点滴静注	day1	21日	
胃がん:S-1 + CDDP	シスプラチン	60mg/m ²	点滴静注	day8	35日	
	S-1	1日2回 40-60mg/回	経口	day1-21		
胃がん:S-1 + CDDP + Trastuzumab	シスプラチン	60mg/m ²	点滴静注	day8	35日	
	S-1	1日2回 40-60mg/回	経口	day1-21		
	トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	点滴静注	day8		
胃がん:XP	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	day1	21日	
	カペシタビン	1日2回 1000mg/m ² /回	経口	day1夕-15朝		
胃がん:XP + Trastuzumab	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	day1	21日	
	カペシタビン	1日2回 1000mg/m ² /回	経口	day1夕-15朝		
	トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	点滴静注	day1		
胃がん:nab-PTX	ナブパクリタキセル	260mg/m ²	点滴静注	day1	21日	
胃がん:G-SOX	オキサリプラチン	100mg/m ²	点滴静注	day1	21日	
	S-1	1日2回 40-60mg/回	経口	day1夕-15朝		
胃がん:G-SOX + Trastuzumab	オキサリプラチン	100mg/m ²	点滴静注	day1	21日	
	S-1	1日2回 40-60mg/回	経口	day1夕-15朝		
	トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	点滴静注	day1		

胃がん:Ramucirumab	ラムシルマブ [®]	8mg/kg	点滴静注	day1	14日	
胃がん:Ramucirumab + PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	day1・8・15	28日	
	ラムシルマブ [®]	8mg/kg	点滴静注	day1・15		
胃がん:CAPOX	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	day1	21日	
	カペシタビン	1日2回 1000mg/m ² /回	経口	day1夕-15朝		
胃がん:Nivolumab	ニボルマブ [®]	240mg/body	点滴静注	day1	14日	
胃がん:Trastuzumab emtansine	トラスツズマブ デルクステカン	6.4mg/kg	点滴静注	day1	21日	
胃がん:mFOLFOX6	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注 (同時投与)	day1	14日	
	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²				
	フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注			
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	day1-2 (46時間)		