

レジメン名	薬剤名	投与量/投与方法	投与日	投与間隔(日)	
大腸がん					
大腸癌:mFOLFOX6	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注 (同時投与)	day1	14日
	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²			
	フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	day1-2 (46時間)	
大腸癌:mFOLFOX6 + BV	ベハシスマブ	5mg/kg	点滴静注	day1	14日
	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注 (同時投与)		
	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²			
	フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	day1-2 (46時間)	
大腸癌:mFOLFOX6 + Panitumumab	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	day1	14日
	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注 (同時投与)		
	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²			
	フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	day1-2 (46時間)	
大腸癌:SOX	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	day1	21日
	S-1	1日2回 40-60mg/回	経口	d1ター-d15朝	
大腸癌:SOX + BV	ベハシスマブ	7.5mg/kg	点滴静注	day1	21日
	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	day1	
	S-1	1日2回 40- 60mg/回	経口	day1ター-15朝	
大腸癌:CAPOX	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	day1	21日
	カペシタビン	1日2回 1000mg/m ² /回	経口	day1ター-15朝	

大腸癌: CAPOX + BV	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	day1	21日
	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	day1	
	カペシタビン	1日2回 1000mg/m ² /回	経口	day1夕-15朝	
大腸癌: FOLFIRI	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注 (同時投与)	day1	14日
	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²			
	フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	day1-2 (46時間)	
大腸癌: FOLFIRI + BV	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	day1	14日
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注 (同時投与)		
	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²			
	フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	day1-2 (46時間)	
大腸癌: FOLFIRI + Panitumumab	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	day1	14日
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注 (同時投与)		
	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²			
	フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	day1-2 (46時間)	
大腸癌: FOLFIRI + Ramucirumab	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	day1	14日
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注 (同時投与)		
	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²			
	フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	day1-2 (46時間)	
大腸癌: CPT-11	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1	14日
大腸癌: CPT-11 + Pmab	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1	14日
	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注		

大腸癌:CAPIRI+ BV	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	day1	21日
	イリテカン	200mg/m ²	点滴静注	day1	
	カペシタビン	1日2回 800mg/m ² /回	経口	d1タ-d15朝	
大腸癌:CAPIRI	イリテカン	200mg/m ²	点滴静注	day1	21日
	カペシタビン	1日2回 800mg/m ² /回	経口	d1タ-d15朝	
大腸癌:IRIS	イリテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1	21日
	S-1	1日2回 40- 60mg/回	経口	d1タ-d15朝	
大腸癌:IRIS + BV	イリテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1	21日
	S-1	1日2回 40- 60mg/回	経口	d1タ-d15朝	
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	day1	
大腸癌:Panitumumab 単独療法	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	day1	14日
大腸癌:Trifluridine/Tipiracil + BV	トリフルリジン・チピラシル 塩酸塩配合	1日2回 35 mg/m ² /回	経口	day1-5 day8-12	28日
	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	day1・15	
Pembrolizumab (MSI-High固形癌)	ペムブロリスマブ	200mg/body	点滴静注	day1	21日